



Ce trebuie să știm despre AUTOVACCIN

Autovaccinul bacterian este o suspensie mono- sau polibacteriană în soluție salină 0,85%, inactivată termic, preparată din tulpini izolate de la pacientul cărui i se administrează în scop terapeutic.

Autovaccinul se prepară **numai pe baza unei recomandări scrise** de la medicul care a examinat pacientul.

Condiții pentru izolarea microbului:

1. pacientul să nu fie sub tratament cu antibiotice (local sau general)
2. să nu aplice pe zonele cutanate afectate creme, loțiuni, pudre care pot inhiba dezvoltarea bacteriană.

ASPECT – După agitare fiolele conțin o suspensie opalescentă omogenă fără grunji, flocoane sau particule străine. În repaus se formează un depozit uniform cu lichidul supernatant, limpede incolor.

INDICAȚII – Autovaccinul se administrează de regulă în infecții cronice, recidivante, **numai pacientului pentru care a fost preparat**: infecții urinare recidivante, infecții cutanate (acnee, furunculoză, abcese, orjelet, hidrosadenită), ulcere cutanate infectate, osteomielită.

CALE DE ADMINISTRARE: Autovaccinul se administrează **numai** în injecții subcutanate.

MODUL DE ADMINISTRARE – Dacă medicul care a recomandat autovaccinul nu dispune altfel, administrarea acestuia se va face în injecții subcutanate la 2-3 zile interval conform schemei din prospect. Fiolele cu autovaccin se agită bine înainte de întrebuițare. După ce s-a extras din fiolă în seringă cantitatea de autovaccin necesară unei injecții, fiola cu restul conținutului se aruncă.

PRECAUȚII – Administrarea autovaccinului se face sub supravegherea medicului care a prescris acest tratament, de către un cadru medical; dacă reacțiile locale sau generale sunt exagerate, intervalul dintre injecții se va mări până la dispariția lor, dar nu mai mult de 6 zile. De regulă, injecția următoare se face la 24 ore după remiterea reacțiilor inoculării precedente; Pe durata administrării autovaccinului se vor evita: eforturile fizice excesive; tratamente asociate cu izotopi radioactivi, citostatice și



medicamente imunodepresante (cortizonice, antiinflamatoare majore etc); alte vaccinuri.

AMBALARE: Cutie cu 20 fiole a 1 ml.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: Autovaccinul se păstrează la temperatura de 2°C... 8°C (la frigider).

TERMEN DE VALABILITATE: Șase luni de la data fabricării.

CONTRAINDICAȚII – Insuficiențe hepatică, renală, cardiacă decompensate, boli febrile intercurrente, tuberculoză activă, alergii la fenol, boli autoimune. Autovaccinul nu se administrează în următoarele condiții fiziologice: primii doi ani de viață, sarcină, în prima zi a ciclului menstrual.

REAȚII LOCALE ȘI GENERALE – Este posibil ca la una din inoculări să apară reacții locale: roșeață, durere, tumefacție sau generale: febră, stare generală proastă care durează 24-48 de ore. Pentru reacții locale exagerate se recomandă aplicarea unei comprese reci.

Lista minimală de analize recomandate pentru verificarea stării funcționale hepatice și renale în vederea administrării unui autovaccin

1. Transaminaza ALT (TGP)
2. Transaminaza AST (TGO)
3. Proteine totale
4. Electroforeza de proteine
5. Glicemie
6. Creatinină
7. GamaGlutamil transferază (GGT) – pentru hepatita toxică, alcoolică
8. AgHBs și Ac HCV - pentru hepatita infecțioasă
9. Pentru suspiciune de **boli autoimune** (exemple: lupus eritematos sistemic, poliartrită reumatoidă, hepatită autoimună, vasculite, sindroame demielinizante, tiroidită autoimună, sindrom Sjogren, etc.) se recomandă determinarea markerilor specifici fiecărei boli, conform indicațiilor medicului

ATENȚIE ! Prepararea autovaccinului durează 30 zile.

Cost:
Recoltarea și identificarea: 65 lei
Prepararea autovaccinului : 260 lei